


CONSEILS POSTOPÉRATOIRES à la suite d'une couronne / CEREC

Le traitement de couronne comporte un haut taux de réussite. Cependant, comme tous autres traitements dentaires, il est impossible de garantir son succès.



1

JOUR DE L'INTERVENTION

ALIMENTATION :

- Mangez du côté opposé le temps que l'anesthésie se dissipe. Il est recommandé de ne pas manger d'aliments collants pour les 48 premières heures afin d'éviter de décimenter (décholler) la couronne.

INCONFORT :

- Inconfort possible à la mâchoire suite au traitement.

2

LES SEMAINES SUIVANTES

SENSIBILITÉ :

- Il est possible qu'une sensibilité au chaud et/ou au froid persiste quelques jours/semaines, surtout si la carie ou l'obturation était profonde.

TEMPORAIRE :

- Si la couronne temporaire tombe avant le rendez-vous de mise en place de la couronne finale, il est préférable de contacter la clinique afin que nous puissions vous guider efficacement.



POUR TOUTE QUESTION OU URGENCE, N'HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER :
450 455-5671

3

RISQUES ET COMPLICATIONS POSSIBLES QUI NÉCESSITENT UN SUIVI

- Décimentation (décollement de la couronne).
- Sensibilité/douleur au chaud, au froid et/ou à la mastication.
- Un ajustement d'occlusion peut être nécessaire à la suite de l'intervention.
- Risque de fracture/fêlure de la dent ou de la racine.
- Risque de nécrose pulpaire (mort de la dent).
- En cas de complications, des traitements additionnels, tels traitements de canaux ou autres, pourraient être à considérer.
- Une plaque occlusale pourrait être suggérée pour préserver la couronne en cas de bruxisme (grincement de dents).



CHEZ SOIE
DENTISTERIE

Polyclinique médicale
de Vaudreuil-Dorion
600, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion (QC)
J7V 6A3

info@chezsoiedentisterie.com
chezsoiedentisterie.com

