CONSEILS APRÈS UN SURFAÇAGE

Les soins postopératoires doivent être respectés
à la lettre pour favoriser la guérison.

1

- Sous anesthésie locale
- Musique
- Nervosité

PENDANT
la procédure

2

- Irrigation de rince-bouche
- Sensibilité

APRÈS
l'intervention

3

- Contrôle à la clinique dans 6 semaines

SUIVI

4

- Rendez-vous aux 3-4 mois
- Hygiène impeccable

SUIVI ET MAINTIEN
pour assurer le succès des traitements

1 LE SURFAÇAGE

- Ce type de traitement, souvent effectué par l'hygiéniste dentaire, consiste à nettoyer en profondeur les zones concernées, sous anesthésie locale. La procédure est sans douleur.
- Cette intervention permet l'accès sous la gencive afin de rendre la surface de la racine lisse et libre de tartre, déloge les bactéries destructrices et les tissus malades.
- Les régions traitées sont ensuite irriguées à l'aide d'une seringue et d'un rince-bouche antiseptique à base de Chlorhexidine afin de diminuer les bactéries et favoriser la guérison.
- Des radiographies peuvent être nécessaires lors du suivi afin d'évaluer la réponse au traitement prodigué.

SI VOUS ÊTES NERVEUX/ANXIEUX :

- N'hésitez pas à mettre vos écouteurs pour vous permettre d'écouter la musique de votre choix tout au long de la procédure.
- Le dentiste peut vous prescrire un anxiolytique* (comprimé pour combattre la nervosité).
  * Il faudra prendre l'anxiolytique 1h **avant** le rendez-vous et vous assurez d'être accompagné.

POUR TOUTE QUESTION OU URGENCE, N'HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER :
450 455-5671

2 APRÈS L'INTERVENTION

HYGIÈNE :

- Continuer l'irrigation avec un rince-bouche antiseptique à la maison à l'aide de la seringue fournie pour une période de 10 jours à raison de 2-3x/ jour et ne pas rincer/boire/manger pour une période de 30 minutes suivant l'irrigation. Il faut également nettoyer entre les dents avec les brossettes interdentaires fournies qui peuvent, elles aussi, être trempées dans le rince-bouche.

SENSIBILITÉ :

- Vous pouvez ressentir une légère sensibilité à la suite du traitement. Cette sensibilité au niveau des gencives est normale et peut persister quelques jours. Vous pouvez prendre de l'acétaminophène/ ibuprofène **(Tylenol/Advil)** au besoin. La sensibilité dentinaire, quant à elle, peut être soulagée en utilisant un dentifrice désensibilisant tel **Sensodyne** ou **Colgate Pro-Relief** sur une base quotidienne.

3 SUIVI DE CONTRÔLE

Six (6) semaines suivant l'intervention, une visite de suivi en clinique sera planifiée afin de réévaluer le résultat du surfaçage. Nous pourrons ainsi noter les améliorations ou les zones plus à risque qui nécessiteraient des traitements supplémentaires.

4 LE SUCCÈS DES TRAITEMENTS

Toute forme de traitement médical ou dentaire, incluant la parodontie, comporte certains risques et limitations. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, le patient doit s'engager à respecter les directives suivantes :

L'HYGIÈNE : Une hygiène buccale impeccable est attendue de la part du patient.

- Brossage adéquat 2 à 3x/ jour avec une technique appropriée et une brosse à poils souples pour un accès plus précis sous la gencive.
- Soie dentaire tous les jours.
- Brossette interdentaire. Le bon format est important, validez le format avec votre hygiéniste dentaire.
- Changez votre brosse à dents ou la tête de brosse électrique tous les 3 mois ou quand les poils sont repliés.

CHEZ SOIE
DENTISTERIE

Polyclinique médicale
de Vaudreuil-Dorion
600, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion (QC)
J7V 6A3

info@chezsoiedentisterie.com
chezsoiedentisterie.com